

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 28-5-73 530250

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE

ABONNEMENT ANNUEL

ET FRANCHE-COMTÉ - 21, route de Seurre - 21 206 BEAUNE - Tél. 5.17 et 9.57 30 Frs

COTE-D'OR - DOUBS - HAUTE-SAONE - JURA - SAONE-&-LOIRE - TERRITOIRE DE BELFORT - YONNE - NIÈVRE

Régisseur de recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture - C. C. P. DIJON 3405.12 K

22 Mai 1973

Bulletin n° 152 - Supplément 3

V I G N E

Mildiou : Les conditions climatiques de ces derniers jours : (pluies du 19 et 21 Mai), et le développement de la végétation (5 à 7 feuilles étalées dans les situations favorables) imposent l'application d'un traitement avant le 30 Mai.

On utilisera un produit organique ou organo-cuprique. Consulter la liste publiée en Mars.

Oïdium : La vigilance est recommandée dans la lutte contre cette maladie. L'adjonction d'un soufre micronisé mouillable à titre préventif à la bouillie anti-mildiou est conseillée.

N.B. : Apporter le maximum de soins à la pulvérisation par le réglage des jets. Vérifier la quantité d'eau et les doses de produits apportées à l'hectare.

ARBRES FRUITIERS

Tavelures du poirier et du pommier : Chaque petite pluie réunit toutes les conditions favorables à une forte contamination : longue humectation des feuilles, température optimum et inoculum important ; la protection des vergers doit donc être sans faille, le renouvellement des traitements étant plus ou moins rapide compte-tenu de l'accroissement foliaire.

Oïdium du pommier : Eliminer et brûler les pousses oïdiées, poursuivre les traitements mixtes oïdium-tavelure.

Psylles du poirier : Surveiller les cultures, utiliser un des insecticides suivants en cas de nécessité :

aziphos methyl : 40 g./hl

methidathion - monocrotophos : 30 g./hl

vamidothion : 50 g./hl

CULTURES LEGUMIERES

Fraisiers : Pucerons : Certaines cultures en cours de floraison sont actuellement contaminées par des pucerons. Seuls peuvent être utilisés pour les détruire des produits non dangereux pour les abeilles tels que phosalone ou endosulfan et à plus de 15 jours du début de la récolte.

HOUBLON (Note IV)

Mildiou : Le temps actuel étant favorable au mildiou, assurer la protection de la végétation par un traitement très soigné.

B E T T E R A V E S

Pégomyies : Le dépôt de très nombreuses pontes s'est généralisé en toutes régions particulièrement en COTE D'OR et dans l'YONNE. Surveiller attentivement l'apparition des dégâts et intervenir à temps si nécessaire.

Dernière note : Bulletin n° 152 - Supplément 2

Les Ingénieurs chargés
des Avertissements Agricoles :

J. PETIOT - M. TISSOT

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie,
Chef de la Circonscription phytosanitaire
"Bourgogne et Franche-Comté"

G. VARLET

P403